

- dl・d-T80-アレスリンがペットに付着したノミ・マダニの成虫をノックダウンし、フェントリンが殺虫!!
- 昆虫成長抑制剤(IGR剤)【ピリプロキシフェン】配合!!
- スプレータイプで、寝床等の環境にも使用可能。トータルの駆除が簡単!!

昆虫成長抑制剤(IGR剤)とは、人やペットに対しては安全性が高く、昆虫だけに作用します。昆虫の成長を抑制し、昆虫のライフサイクルを遮断する成分です。

### 早く効く!

被毛に直接スプレーするので、効果的に素早く駆除できます。


### 長く効く!

1回の使用で約1ヶ月間効果が持続します。


### 元から効く!

寝床等の環境にも使用可能で、トータルの駆除ができます。

#### ・ノミのライフサイクル



#### ・マダニのライフサイクル



\*ライフサイクルは湿度・温度により変化します。

**ご使用前に必ずお読みください。** ご使用前にこの説明書をよく読み、理解してから使用してください。

### ●初めて使用される方へ

犬の年齢や体の大きさにより使用量が異なったり、体質に合わない場合があります。初めて使用する際には様子を見ながら使用し、以下のような症状が出た場合は使用を中止し、シャンプーで洗い流してください。おさまらない場合は獣医師に相談してください。

- ・過剰に興奮する
- ・皮膚や粘膜がはれたり赤くなる
- ・毛のぬれを気にする
- ・スプレーされることを嫌がる
- ・抜け毛
- ・食欲不振
- ・ヨダレ
- ・ふけ
- ・元気がなくなる
- ・処理部位をかく



**使用を中止しシャンプーで洗い流してください。**

◎販売名: ダニ・ノミ退治エアゾール犬用

◎効果効果: 犬: ノミ、マダニの駆除  
寝床: ノミ、マダニの駆除

◎用法及び用量: 犬の顔以外の被毛全体に、1ヶ月に1回を限度としてスプレーする。体重あたりの使用量は下表のとおり。

犬の体重	使用量
12kg以下	3~4mL×体重(kg)
13~24kg	2~3mL×体重(kg)
25kg以上	1.5~2mL×体重(kg)

1秒間噴射: 約4mL

寝床にノミ、マダニがいたとき、寝床400cm<sup>2</sup>あたり1mLを、1ヶ月に1回を限度としてスプレーする。

例) 13kgの犬の場合、約26mLを、全身(被毛全体)にムラなくスプレーしてください。

◎有効成分: フェントリン、dl・d-T80-アレスリン、ピリプロキシフェン

◎内容量: 200mL

◎火気厳禁 危険等級Ⅱ

第4類 アルコール類(水溶性)IPA 110mL

## ◎使用方 法:使用前に缶をよく振ってください。

使用の際にはゴム手袋を着用し、火気のそばでは使用しないでください。

- ①スプレーする箇所に本品を垂直にして、ボタンを押してください。  
※使用の際は本品を横向きや逆さにしないでください。
- ②犬に対しては、毛並みとは逆方向から被毛全体が湿るようにムラなくスプレーしてください。  
※毛の長い犬は毛を逆立たせ、奥まで届くようにしてください。
- ③顔や粘膜の周辺は、薬剤がつかないように、注意してください。
- ④スプレー後は犬が体をなめないように注意し、自然に乾燥させてください。  
※乾燥後は約1ヶ月間効果が持続します。

## ◎使用上の注意

### 【一般的注意】

- (1)本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (2)犬および犬の寝床以外に使用しないこと。
- (3)本剤は定められた用法及び用量を厳守し、1ヶ月以内に繰り返しスプレーしないこと。

### 【使用者に対する注意】

- (1)ゴム手袋等を着用すること。薬剤が手や肌に付着した際や、使用後は石けんでよく洗うこと。
- (2)スプレーする際は風通しの良い所で行い、乾くまで十分換気すること。
- (3)スプレー後、完全に乾くまでは犬および寝床に直接触れないこと。また、スプレーしたことを知らない人も触れないように注意すること。特に小児が、スプレーした犬および寝床に触れないように注意すること。
- (4)薬剤が肌、目、粘膜等につかないようにスプレーすること。付着した際には直ぐに水で洗い流すなどの処置をすること。
- (5)薬剤を飲み込んだり、発疹、かゆみなど体に異常が認められた際には医師に相談すること。
- (6)本剤の有効成分はスプレーした犬の被毛および寝床に長時間にわたり残るので、用法及び用量を守るよう注意すること。

### 【犬に対する注意】

#### 1.制限事項

生後5ヶ月未満の犬、体重2kg未満の犬、妊娠授乳期の犬、アレルギー体質の犬、外傷のある犬および体調に異常の見られる犬には使用しないこと。

#### 2.副作用

- (1)スプレー後数日以内に皮膚のかぶれ、発疹、アレルギー症状などが認められた際には使用を中止し、速やかに獣医師の診察を受けること。

#### 3.適用上の注意

- (1)本剤は外用以外に使用しないこと。
- (2)犬にスプレーする際には換気の良いところで行うこと。また、寝床にスプレーする際には犬を遠ざけるように注意すること。
- (3)犬の顔以外の被毛全体もしくは寝床に均一になるようにスプレーすること。被毛やノズルから薬剤が垂れそうになったときは、直接触らず、ペーパータオルなどで拭き取ること。
- (4)スプレー後は火や他の熱源を遠ざけ、換気の良いところで自然乾燥させること。
- (5)効果が低下することがあるので、スプレー後約1ヶ月間はシャンプーや入浴、雨などで体が濡れるのを避けること。
- (6)餌を与えながらスプレーしないこと。
- (7)犬が吸い込むことがないように十分注意してスプレーすること。薬剤が犬の顔、目、粘膜などについた場合には直ぐに水で洗い流すなどの処置をすること。
- (8)スプレー後、乾くまでは犬が被毛や寝床を舐めたり触れたりしないように注意すること。
- (9)本剤は約1ヶ月間の効果があるので1ヶ月以内に再度スプレーを行わないこと。

### 【取り扱い上の注意】

- (1)塗料やプラスチック製品などに付着しないようにすること。
- (2)火気に向けて、および火気周辺ではスプレーしないこと。
- (3)使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
  - (1)中味を使い切ってから捨てること。
  - (2)容器に表示される「残ガス排出キャップの使用について」の説明に従ってガスを抜くこと。

### 【保管上の注意】

- (1)幼小児の手の届かない所に保管すること。
- (2)直射日光の当たる場所、火気付近、高温の場所を避け、涼しい所で保管すること。

### 【その他の注意事項】

- (1)本剤の有効成分であるアレスリンには変異原性があるとの文献報告がある。

- ★廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。
- ★品質管理には万全を期しておりますが、お気づきの点がありましたらお客様相談室までお問合せください。

## 発売元 株式会社 ペティオ

東京本社 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11 コスモ金杉橋ビル4F

お客様相談室 受付時間:祝日を除く月～金曜日  
☎0120-133-035 AM9:00～12:00/PM1:00～5:00

<http://www.petio.com>

製造販売元

株式会社 児玉兄弟商会

〒649-0123 和歌山県海南市下津町丁29